

VALIDO PER TUTTI I TRATTAMENTI

MONITORAGGIO DELL'EFFICACIA E SICUREZZA



- Il timing degli esami è solitamente: ogni 3 mesi nel primo anno, ogni 6-12 mesi successivamente;
- La scelta del tipo di esami e il timing risulta in ogni caso

personalizzata sulla singola persona a prescrizione da uno specialista endocrinologo;

- E' importante affidarsi a personale sanitario specializzato, al fine di garantire cure efficaci e sicure, mantenendo un bilancio favorevole tra risultati ottenuti e sicurezza del trattamento.

CONTATTI

CENTRO SOS IRIDE

VIA DEL NASTRO AZZURRO 1A BERGAMO


TELEFONO 333 1278436

info@sosiride.org

www.sosiride.org



TRATTAMENTI ORMONALI AFFERMATIVI



COSA E' IMPORTANTE
SAPERE QUANDO DECIDI DI
FARE QUESTA SCELTA?



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità



Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
a difesa delle differenze



I professionisti che si occupano di salute transgender hanno il compito di supportare gli utenti nell'esplorare l'identità di genere e i cambiamenti corporei desiderati, al fine di garantire un approccio individualizzato durante il percorso

di affermazione di genere, anche in merito alla terapia ormonale di affermazione di genere.

La terapia ormonale viene personalizzata tenendo in considerazione le necessità individuali, nonché i fattori di rischio e lo stato di salute della persona.

E' raccomandato sottoporsi a regolari controlli con esami ematici e strumentali come ritenuto appropriato dall'endocrinologo (in genere ogni 3 mesi circa il primo anno di terapia e meno frequenti successivamente). Si raccomanda inoltre uno **stile di vita sano** durante il trattamento.

LA TERAPIA FEMMINILIZZANTE

Lo scopo della terapia femminilizzante è quello di indurre le caratteristiche sessuali femminili. La terapia si basa sull'utilizzo di ormoni estrogeni (per promuovere la femminilizzazione).




Alcuni dei rischi delle terapie ormonali includono:

Il rischio trombo-embolico è la complicanza più temibile in terapia con estro-progestinici, variabile in base alla dose, alla via di somministrazione, al tipo di estrogeni utilizzati e

all'associazione o meno di progestinici. Il fumo e l'obesità incrementano questo rischio. Tipicamente gli episodi trombo-embolici avvengono durante il primo anno di terapia.



LA TERAPIA MASCOLINIZZANTE



Lo scopo della terapia mascolinizzante è quello di ridurre le caratteristiche sessuali femminili e di indurre quelle maschili. La terapia mascolinizzante si basa sulla somministrazione dell'ormone sessuale testosterone.

Alcuni dei rischi delle terapie ormonali includono:

Aumento dei globuli rossi, alopecia androgenica, acne e seborrea, ipertensione arteriosa, aumento della libido.